

## Transnasale Sonde

Indikation: enterale Ernährung (Dysphagie, Stenosen im GIT), Entlastung (Ileus, Anastomose), Aspirationsschutz (invasiv und nichtinvasiv beatmeter Patienten)


**CAVE:**

- Ösophagus Varizen
- Verletzungen im Mund-/Rachenraum
- Tumore, Verätzungen, Stenosen




Patient: Oberkörperhochlagerung, Kopf neigen, ausreichend informieren, Materialien richten

Magensonde langsam und ohne Druck über das größere Nasenloch vorschieben, beim Erreichen des Rachenraums den Pat. zum mehrfachen Schlucken auffordern und weiter vorschieben




Magensonde fixieren



Lagekontrolle der Magensonde:

- Aspiration von Magensaft
- Röntgenkontrolle
- Luftinsufflation bei gleichzeitiger Auskultation über den Magen (Blubbern)



**CAVE: Lagekontrolle vor jeder Applikation!**

## Quelle

### **Bild:**

Abb. 1-4:

<https://www.apotheken-umschau.de/Magensonde> (Zugriff am 10.03.2019, 19:30)

### **Literatur:**

<https://www.thieme.de/viamedici/klinik-medical-skills-praxisanleitungen-1551/a/medical-skills-praxianleitungen-legen-einer-magensonde-22995.htm>  
(Zugriff am 10.03.2019, 19:15)